

**WICHTIG - PATIENTENPASS**  
**Abacavir/Lamivudin Teva (Abacavir / Lamivudin) Filmtabletten**  
**Tragen Sie diese Karte immer bei sich.**

Da Abacavir/Lamivudin Teva Abacavir enthält, können einige Patienten, die Abacavir/Lamivudin Teva einnehmen, möglicherweise eine Überempfindlichkeitsreaktion (schwerwiegende allergische Reaktion) entwickeln. Diese **kann lebensbedrohlich werden**, wenn Abacavir/Lamivudin Teva weiterhin eingenommen wird.

**SETZEN SIE SICH SOFORT MIT IHREM ARZT IN VERBINDUNG, damit er entscheiden kann, ob Sie die Therapie mit Abacavir/Lamivudin Teva absetzen müssen, wenn:**

- 1) Sie einen Hautausschlag bekommen ODER
- 2) Sie aus mindestens ZWEI der folgenden Gruppen eines oder mehrere Symptome (Beschwerden) entwickeln:
  - Fieber
  - Kurzatmigkeit, Halsschmerzen oder Husten
  - Übelkeit oder Erbrechen oder Durchfall oder Bauchschmerzen
  - starke Müdigkeit oder diffuse Schmerzen oder ein allgemeines Unwohlsein

Wenn Sie Abacavir/Lamivudin Teva aufgrund einer solchen Überempfindlichkeitsreaktion abgesetzt haben, **NEHMEN SIE NIE WIEDER** Abacavir/Lamivudin Teva oder ein anderes Abacavir-haltiges Arzneimittel **EIN**, da es **innerhalb von Stunden** zu einem lebensbedrohlichen Blutdruckabfall oder zum Tod kommen kann.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass sich bei Ihnen eine Überempfindlichkeitsreaktion auf Abacavir/Lamivudin Teva entwickelt, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Arzt in Verbindung. Notieren Sie sich hier den Namen und die Anschrift Ihres behandelnden Arztes:

Arzt: ..... Tel.: .....

Wenn Ihr Arzt nicht erreichbar ist, müssen Sie sofort nach einer anderen Möglichkeit suchen, ärztlichen Rat einzuholen (z. B. die Notfallambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses).

Für allgemeine Anfragen zu Abacavir/Lamivudin Teva wenden Sie sich bitte an Ihre Apotheke oder Ihren Arzt.

Versionscode: Z03